

園でよくみられる感染症

病名	証明書	初期症状	潜伏期間	登園禁止期間
インフルエンザ	◎	発熱、咳、頭痛、 関節炎	1日～2日	発症翌日から5日経過し、かつ、 解熱後3日すぎるまで
百日咳	◎	発熱、激しい咳、 粘っこい痰	約2日	特有の咳が消失するまで
はしか	◎	発熱、食欲不振、 口中や首に発疹	10日～12日	解熱後3日すぎるまで
おたふくかぜ	◎	発熱、耳下線（耳たぶ の下）が腫れる	2～3週間	耳下線の腫れが消失するまで
3日はしか （風疹）	◎	発病、発疹	14日～21日	発疹が消失するまで
水ぼうそう	◎	発熱、全身に粟粒大の 発疹、水泡が現れかさ ぶたになる	11日～21日	すべての発疹がかさぶたになる まで
プール熱 咽頭結膜炎	◎	発熱、咽頭炎、結膜炎	5日～7日	主症状が消失後2日過ぎてから
流行性角結膜炎	◎	充血、目やに、 リンパ節の腫れ		治癒するまで
急性出血性角結膜炎	◎	充血、目がごろごろす る、リンパ節の腫れ		
結核	◎	咳、発熱がつづき呼吸 が荒くなる		医師により感染の恐れがないと 認めるまで
腸管出血性大腸菌 感染症	◎	腹痛、嘔吐、下痢、 血便、けいれん	3日～8日	医師が登園してもよいと認めた 時
嘔吐下痢症・ 感染症胃腸炎 （ノロ・ロタウィルス）	◎	嘔吐、下痢		主症状が消滅するまで

* 感染性胃腸炎 嘔吐物や下痢便で汚染された衣服については、保健所の指導により保育所で洗うと二次感染を起こす可能性が高いため、そのままビニール袋に入れて保護者に持ち帰って頂くことになりました。家庭で、衣類を廃棄せず洗濯する場合は、塩素系の消毒薬で消毒するか、熱水で消毒してから洗濯してください。

病名	証明書	初期症状	潜伏期間	登園禁止期間
RSウイルス感染症	◎	鼻水、咳、高熱、呼吸が荒くなる	2日～8日	医師が登園してもよいと認めた時
带状疱疹		皮膚の痛み、発疹、水疱		すべてかさぶたになるまで
ヘルパンギーナ	◎	発熱、喉の痛み	1日～2日	医師及び園が登園してもよいと認めた時
手足口病		手足に小さな水泡、口内炎	約2日	
溶連菌感染症		発熱、発疹、頭痛吐き気	2日～7日	有効治療を始めてから2日経過するまで
マイコプラズマ肺炎	◎	頑固な咳、発熱	2～3週間	主な症状が消失し、医師及び園が登園してもよいと認めた時
突発性発疹		発病、下痢後発疹	10日	
ヘルペス性(歯内口内炎)		発熱、痛み、摂食不能	11日～21日	
とびひ		赤ただれとかさぶた	5日～7日	他人へ感染の恐れがないと医師が認めた時
伝染性紅斑(リンゴ病)	◎	発熱、ほほに赤い発疹	10日～20日	医師及び園が登園してもよいと認めた時
しらみ		成虫、たまご(白い粒)が髪の毛の寝元についている		

◎がついている病名は登園許可書が必要です。